

芍药花

Shaoyaohua

【药材来源】 本品为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的干燥花蕾。夏季花含苞待放时采摘，除去叶，用纸将花朵包好，阴干。以朵大、完整、色鲜艳者为佳。

【炮制】 取原药材，用时剥去纸。

【性状】 本品呈圆球形，具柄。外表黄白色至黄棕色。萼片 3~4 枚，叶状，淡绿色；花瓣 6~10 片或更多，呈倒卵形，黄白色至黄棕色。雄蕊多数，花药黄色至橙黄色。气微香，味微苦涩。

【鉴别】 取本品粉末 0.5g，加乙醇 10ml，振摇提取 5 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（40:5:10:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%香草醛硫酸溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的蓝紫色斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用 20%乙醇作溶剂，不得少于 35.0%。

【性味与归经】 苦，凉。归肝经。

【功能与主治】 通经活血，用于妇女经闭，干血癆症，赤白帶下。

【用法与用量】 3~6g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。