

萱草根

Xuancaogen

【药材来源】 本品为百合科植物萱草 *Hemerocallis fulva* L.、金针菜 *Hemerocallis citrina* Baroni 或小萱草 *Hemerocallis minor* Mill.的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，洗净，略烫，晒干。以纺锤形块根多、质饱满者为佳。

【炮制】 取原药材，除去杂质及残茎，洗净，闷润 4~6 小时，至内外湿度一致，切中段，干燥，筛去碎屑。

【性状】 本品为不规则中段。表面灰黄色或淡灰棕色，有多数横纹及纵皱纹。切面灰黄色或灰棕色，有的可见放射状裂纹，中间有淡黄色圆心。质疏松。气微香，味淡。

【鉴别】 取本品粉末 2g，加乙醇 20ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水 10ml、盐酸 2ml，置水浴上加热回流 30 分钟，立即冷却，用乙醚振摇提取 2 次，每次 50ml，合并提取液，蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取大黄酸对照品、大黄素对照品、大黄酚对照品，加无水乙醇制成每 1ml 各含 1mg 的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（30~60℃）-甲酸乙酯-甲酸（15:5:1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 11.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 6.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【性味与归经】 甘，凉；有毒。归脾、肺经。

【功能与主治】 利尿消肿，清热凉血。用于水肿，小便不利，淋浊，带下，黄疸，乳痈，热衄，便血，崩漏。

【用法与用量】 3~6g。

【注意】 多服会导致视力损伤、小便失禁。

【贮藏】 置干燥处。