

炒没药

chaomoyao

【药材来源】本品为橄榄科植物地丁树 *Commiphora myrrha* Engl. 或哈地丁树 *Commiphora molmol* Engl. 的干燥树脂。分为天然没药和胶质没药。11 月至翌年 2 月或 6~7 月采收。由树皮裂缝处渗出；或割裂树干，收集流出的树脂，除去树皮等杂质，阴干。以块大、色棕红、香气浓者为佳。

【炮制】取原药材，除去树皮等杂质，大块者破碎。取净没药，置热锅内，用文火加热，炒至表面显油亮光泽时，取出，晾凉。

【性状】本品呈不规则小块或类圆形颗粒，表面棕黄色至黑褐色，有光泽。气微香，味苦而微辛。

【鉴别】取〔含量测定〕项下的挥发油适量，加环己烷制成每 1ml 含 50mg 的溶液，作为供试品溶液。另取天然没药对照药材或胶质没药对照药材各 2g，照挥发油测定法（中国药典 2020 年版通则 2204 乙法）加环己烷 2ml，缓缓加热至沸，并保持微沸约 2.5 小时，放置后，取环己烷溶液作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 4 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙醚（4:1）为展开剂，展开，取出，晾干，立即喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】杂质 不得过 10%（中国药典 2020 年版通则 2301）。

总灰分 不得过 15.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 8.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【含量测定】取本品 20g，精密称定，照挥发油测定法（中国药典 2020 年版通则 2204 乙法）测定。

本品含挥发油不得少于 2.0%（ml/g）。

【性味与归经】辛、苦，平。归心、肝、脾经。

【功能与主治】活血止痛，消肿生肌。用于瘀血疼痛，经闭。癥瘕，痈疽，疮疡溃破久不收口。

【用法与用量】3~9g。多入丸散；外用适量，研末调敷患处。

北京市中药饮片炮制规范（2023 年版）

【注意】 孕妇禁用；胃弱者慎用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。