

蒲葵子

Pukuizi

【药材来源】本品为棕榈科植物蒲葵 *Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. 的干燥成熟果实。春季采收，晒干。

【炮制方法】取原药材，除去杂质，洗净，干燥，筛去灰屑。

【性状】本品呈橄榄形，长 1.5~2.5cm，宽 1~1.5cm。表面黑褐色，具不规则细纵皱纹，可见 1~3 条纵向细棱，一端具果柄痕。质坚硬。敲开外壳，内面为黄色硬质种皮，可与外皮剥离。种子 1 枚，极坚硬，难粉碎；切面乳白色，角质。气微，味涩。

【鉴别】取本品粉末 1g，加水 3ml，微热数分钟，取上清液 2 滴，加 1% 三氯化铁溶液 2 滴，显污绿色。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用 80%乙醇作溶剂，不得少于 6.0%。

【性味与归经】甘、苦，平。

【功能与主治】止血，抗癌。用于血崩，外伤出血，癌症。

【用法与用量】止血 6~9g，抗癌 50g。用时捣碎。

【贮藏】置阴凉干燥处。