

花生仁衣

Huashengrenyi

【药材来源】 本品为豆科植物落花生 *Arachis hypogaea* L. 的干燥种皮。收集种皮，晒干。以身干、片大、色鲜艳者为佳。

【炮制】 取原药材，除去杂质，筛去灰屑。

【性状】 本品为不规则薄膜状片。外表面淡红色至棕红色，可见纵向的筋脉纹。内表面淡黄白色至淡黄色。质轻，易碎。气微，味涩、微苦。

【鉴别】 (1) 本品粉末浅红色至棕红色。种皮细胞顶面观呈类多角形，壁呈条纹状增厚，有的条纹长达细胞中心，有的细胞内含棕色物。薄壁细胞淡黄色，细胞壁波状，含棕黄色物。可见环纹、螺旋导管。

(2) 取本品粉末 0.5g，加甲醇 15ml，超声处理 30 分钟，放冷，滤过，滤液作为供试品溶液。另取花生红衣对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10~20 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以二氯甲烷-甲醇-甲酸（4:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%香草醛硫酸溶液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 4.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 20.0%。

【性味与归经】 甘、涩，平。归肺、脾、肝经。

【功能与主治】 收敛止血。用于体内外多种出血症，血小板减少性紫癜。

【用法与用量】 3~9g。

【贮藏】 置通风干燥处。