

## 京制淡豆豉

Jingzhi Dandouchi

【药材来源】本品为豆科植物大豆 *Glycine max* (L.) Merr. 的干燥成熟种子(黑豆)的发酵加工品。以质柔软、气香者为佳。

【炮制】 方法一 取清瘟解毒汤，置锅内，用文火煎煮两次，第一次加水 10 倍量煎煮 1 小时，第二次加水 10 倍量煎煮 1 小时，分次滤过，合并滤液，与净黑豆同置锅内煮沸，不断翻动，至汤吸尽，黑豆膨胀时，取出，再取青蒿与黑豆拌匀，置适宜容器内盖严，置适当温度下，待发酵后，取出，干燥，簸去青蒿。

每 100kg 净黑豆，用清瘟解毒汤一剂，煎汤 30~40kg，青蒿 15kg。

附注:清瘟解毒汤方

|          |          |
|----------|----------|
| 白芷 180g  | 玄参 360g  |
| 柴胡 180g  | 连翘 360g  |
| 桔梗 240g  | 川芎 180g  |
| 黄芩 240g  | 羌活 240g  |
| 赤芍 240g  | 天花粉 240g |
| 葛根 180g  | 甘草 180g  |
| 淡竹叶 120g | 生姜 240g  |

以上十四味共煎汤。

方法二 将桑叶、青蒿各 7kg，用文火煎煮两次，第 1 次加水 10 倍量，第 2 次加水 8 倍量，滤过，煎液约 100kg，拌入净黑豆 100kg 中，待吸尽后，蒸 2 小时至透，取出，稍晾，再置容器内，用煎过的桑叶、青蒿渣覆盖，放入平均室温为 23℃ 房间发酵约 16 天至生出白霉衣时，取出，除去药渣，洗净，置容器内再闷 7 天，至充分发酵、香气溢出时，取出，略蒸，干燥。

【性状】 本品呈椭圆形，略扁，长 0.6~1cm，直径 0.5~0.7cm。表面灰黑色或黑色，皱缩不平。断面黄棕色、灰绿色或棕黑色。气微香，味微甘。

【鉴别】 取本品 1g，研碎，加水 10ml，加热至沸，并保持微沸数分钟，滤过。取滤液 0.5ml，点于滤纸上，待干，喷以 1%吡啶-醋酸（10:1）的混合溶液，干后，在 100~110℃加热约 10 分钟，显紫红色。

【检查】 取本品 1g，研碎，加水 10ml，在 50~60℃水浴中温浸 1 小时，滤过。取滤液 1ml，加 1%硫酸铜溶液与 40%氢氧化钾溶液各 4 滴，振摇，应无紫红色出现。

水分 不得过 12.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

黄曲霉毒素 照真菌毒素测定法（中国药典 2020 年版通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B1 不得过 5μg，含黄曲霉毒素 G2、黄曲霉毒素 G1、黄曲霉毒素 B2 和黄曲霉毒素 B1 的总量不得过 10μg。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 18.0%。

【性味与归经】 苦、辛，凉。归肺、胃经。

【功能与主治】解表，除烦，宣发郁热。用于外感表证、寒热头痛，烦躁胸闷，虚烦不眠。

【用法与用量】 6~12g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。