

## 小草

Xiaocao

【药材来源】本品为远志科植物远志 *Polygala tenuifolia* Wild. 的干燥地上部分。4~5 月开花时采割地上部分，去净杂质，晒干。以质嫩、色绿者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，抢水洗，闷润 2~4 小时，切段，干燥，筛去碎屑。

【性状】本品为不规则段。茎圆柱形，细小，灰绿色至黄褐色，切面中空。叶线状披针形，全缘。有时可见蓝紫色花或扁平的蒴果。质脆易断。气微，味微苦。

【鉴别】（1）本品粉末灰绿色或暗绿色。叶下表皮细胞壁波状弯曲，气孔为不定式。单细胞非腺毛长短不一，长 100~200 $\mu\text{m}$ ，有的弯曲，壁厚，木化，表面具疣状突起。茎表皮细胞类长方形。纤维成束，壁木化。螺纹或梯纹导管多见，直径 8~12 $\mu\text{m}$ 。草酸钙簇晶棱角稍钝，直径 10~18 $\mu\text{m}$ 。

（2）取本品粉末 0.5g，加 50%甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取小草对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 4 $\mu\text{l}$ ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（20:1:1）的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 10.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 4.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【性味与归经】辛、苦，平。归肺、心经。

【功能与主治】补阳益精，安神定志。用于梦遗滑精，肾亏虚弱。

【用法与用量】3~9g。

【贮藏】置通风干燥处。