

艾叶炭

Aiyetan

【药材来源】本品为菊科植物艾 *Artemisia argyi* Lévl. et Vant. 的干燥叶。夏季花未开时采摘，除去杂质，晒干。以叶片大而厚、背面色灰白、绒毛多、香气浓、无杂质者为佳。

【炮制】取净艾叶搓散，置热锅内，用中火炒至表面黑褐色时，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，过筛，晾干。

【性状】本品为不规则的碎片，多皱缩、破碎，表面黑褐色，有细条状叶柄。完整叶片少见。有焦糊气。

【鉴别】取本品粉末 2g，加石油醚（60~90℃）25ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液挥干，残渣加正己烷 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取艾叶对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2~5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-甲苯-丙酮（10:8:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1% 香草醛硫酸溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 18.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 5.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 16.0%。

【性味与归经】辛、苦，温；有小毒。归肝、脾、肾经。

【功能与主治】散寒止痛，温经止血。用于少腹冷痛，经寒不调、宫冷不孕，吐血，衄血，崩漏经多，妊娠下血。

【用法与用量】3~9g。

【贮藏】置阴凉干燥处。