

炒芡实

Chaoqianshi

【药材来源】本品为睡莲科植物芡 *Euryale ferox* Salisb. 的干燥成熟种仁。秋末冬初采收成熟果实，除去果皮，取出种子，洗净，再除去硬壳（外种皮），晒干。以断面色白、粉性足者为佳。

【炮制】取净芡实，置热锅内，文火炒至表面微黄色，取出，晾凉。

【性状】本品呈类球形或半球形，多为破粒，完整者直径 5~8mm。表面有深棕红色至黑色内种皮，一端浅黄至黄棕色，约占全体 1/3，有凹点状的种脐痕，断面微黄色至浅棕黄色，偶见焦斑，粉性。具焦香气，味淡。

【鉴别】（1）本品粉末黄白色。主为淀粉粒，单粒类圆形，直径 1~4 μ m，大粒脐点隐约可见；复粒多数由百余分粒组成，类球形，直径 13~35 μ m，少数由 2~3 分粒组成。

（2）取本品粉末 2g，加二氯甲烷 30ml，超声处理 15 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙酸乙酯 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芡实对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-丙酮（5:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 8.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 2.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 40.0%。

【性味与归经】 甘、涩，平。归脾、肾经。

【功能与主治】 益肾固精，补脾止泻，除湿止带。用于遗精滑精，遗尿尿频，脾虚久泻，白浊，带下。

【用法与用量】 9~15g，用时捣碎。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。