

朱茯苓

Zhufuling

【药材来源】本品为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核。多于 7~9 月采挖，挖出后除去泥沙，按不同部位切制，阴干，去皮后切制的茯苓称为“茯苓块”。

【炮制】取净茯苓块，喷水少许，湿润后，用筛撒入朱砂粉，拌匀，至外面挂匀朱砂，晾干。

每 100kg 净茯苓块，用朱砂粉 2kg。

【性状】本品为不规则的块，大小不一，表面裹有朱红色粉末。体重，质坚实，切面颗粒性。气微，味淡，嚼之粘牙。

【鉴别】（1）本品粉末淡红白色。不规则颗粒状团块和分枝状团块无色，遇水合氯醛液渐溶化。菌丝无色或淡棕色，细长，稍弯曲，有分枝，直径 3~8 μ m，少数至 16 μ m（茯苓）。不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色（朱砂）。

（2）取本品粉末少量，加碘化钾碘试液 1 滴，显深红色。

（3）取本品粉末 1g，加乙醚 50ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取茯苓对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（20:5:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2%香草醛硫酸溶液-乙醇（4:1）混合溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

【检查】水分 不得过 18.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 2.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的冷浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 2.5%。

【性味与归经】甘、淡，平。归心、肺、脾、肾经。

【功能与主治】利水渗湿，健脾宁心。用于水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。

【用法与用量】9～15g。

【注意】本品含有朱砂，不宜大量服用，也不宜少量久服；孕妇及肝肾功能不全者禁用。

【贮藏】置通风干燥处，防潮。