

凤仙花

Fengxianhua

【药材来源】本品为凤仙花科植物凤仙花 *Impatiens balsamina* L. 的新鲜或干燥花。夏、秋二季采摘初开的花朵，鲜用；或晒干。前者称“鲜凤仙花”，后者称“凤仙花”。

【炮制】鲜凤仙花 取原药材，除去杂质。

凤仙花 取原药材，除去杂质，筛去灰屑。

【性状】鲜凤仙花 本品白色、粉红色或紫色，单瓣或重瓣；萼片 2，宽卵形，有疏短柔毛；旗瓣圆，先端凹，有小尖头，背面中肋有龙骨突；翼瓣宽大，有短柄，2 裂，基部裂片近圆形，上部裂片宽斧形，先端 2 浅裂；唇瓣舟形，被疏短柔毛，基部突然延长成细而内弯的距；花药卵球形，顶端钝。气微，味微苦。

凤仙花 本品呈皱缩不规则的团块状，易碎。表面浅黄棕色、粉红色或深棕色。部分有花萼残留，花瓣状，有距；花瓣 5 片，旗瓣圆，先端凹；翼瓣宽大，有短柄，2 裂，基部裂片近圆形，上部裂片宽斧形，先端 2 浅裂；唇瓣被疏短柔毛，基部延长成细而内弯的距；多数具细小花梗。气微，味微苦。

【鉴别】本品粉末淡棕黄色。花粉粒长椭圆形，具 4 个萌发孔，分列于两端，对称排列，外壁具网状沟纹。花梗上的非腺毛由 2~20 个细胞组成，少数有分枝，表面有时可见角质细纹。

【检查】水分 凤仙花 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 凤仙花 不得过 12.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】凤仙花 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 20.0%。

【性味与归经】甘、温。归肝经。

【功能与主治】活血消积，祛风止痛。用于瘀血肿痛，腰胁痛，毒蛇咬伤，痈疖疮。

【用法与用量】3~6g。外用捣敷或煎水熏洗。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 置通风干燥处。