

京制炙淫羊藿

Jingzhi Zhiyinyanghuo

【药材来源】本品为小檗科植物淫羊藿 *Epimedium brevicornu* Maxim.、箭叶淫羊藿 *Epimedium sagittatum* (Sieb. et Zucc.) Maxim.、柔毛淫羊藿 *Epimedium pubescens* Maxim. 或朝鲜淫羊藿 *Epimedium koreanum* Nakai 的干燥叶。夏、秋季茎叶茂盛时采割，除去粗梗及杂质，晒干或阴干。以叶多、色黄绿、完整者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，摘取叶片；或喷淋清水，闷润 30 分钟，切宽丝，干燥。取羊脂油加热熔化，加入淫羊藿片或丝拌匀，用文火炒至表面均匀有光泽，呈黄绿色时，取出，晾凉；或取淫羊藿片或丝，置热锅内，用文火边炒边淋入炼成的羊脂油，至表面均匀有光泽，呈黄绿色时，取出，晾凉。

每 100kg 淫羊藿片或丝，用羊脂油（炼油）20~30kg。

【性状】本品呈片状或长短不一的丝片状，上表面黄绿色或浅棕绿色，显油亮光泽，可见网纹状叶脉，下表面灰绿色，主脉及细脉突起，边缘有刺毛状细锯齿，近革质或革质，微有羊脂油气，味微苦。

【鉴别】取本品粉末 0.5g，加乙醇 10ml，温浸 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取淫羊藿苷对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取供试品溶液 2~5 μ l、对照品溶液 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-丁酮-甲酸-水（10:1:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【含量测定】照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相 A，以水为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟 1.5ml；检测波长为 270nm。理论板数按淫羊藿苷峰计算应不低于 1500。

时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0~29	25	75
29~30	25→41	75→59
30~55	41	59

对照品溶液的制备 取淫羊藿苷对照品、宝藿苷 I 对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含淫羊藿苷 0.1mg、宝藿苷 I 10μg 的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过三号筛）约 0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入稀乙醇 20ml，称定重量，超声处理（功率 500W，频率 50kHz）1 小时，放冷，再称定重量，用稀乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含淫羊藿苷（C₃₃H₄₀O₁₅）和宝藿苷 I（C₂₇H₃₀O₁₀）的总量不得少于 0.60%。

【性味与归经】 辛、甘，温。归肝、肾经。

【功能与主治】 补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于肾阳虚衰，阳痿遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛。

【用法与用量】 6~10g。

【贮藏】 置通风干燥处。