

## 凤眼草

Fengyancao

【药材来源】本品为苦木科植物臭椿 *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle 的干燥成熟果实。秋季采收，除去果柄，晒干。以饱满、色淡黄棕者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质。

【性状】本品呈扁平的长椭圆形。表面淡黄棕色，具细密的纵脉纹，微具光泽。中央突起呈扁球形，其上有一横向脊纹通向一侧边。种子 1 枚，扁心形，种皮黄色，内有 2 片富油质的子叶，呈淡黄色。膜质，质脆。气微，味苦。

【鉴别】取本品粉末 2g，加无水乙醇 30ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取凤眼草对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇（40:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 11.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 9.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 13.0%。

【性味与归经】 苦、涩，寒。归心、大肠、膀胱经。

【功能与主治】 清热，凉血，燥湿。用于痢疾，便血，尿血，崩漏，白带。

【用法与用量】 3～9g。外用适量，煎水冲洗。

【贮藏】置干燥处。

