

## 栗子花

Lizihua

【药材来源】本品为壳斗科植物栗 *Castanea mollissima* Bl. 的干燥雄花序。夏至以前采集花穗，编成长绳状，晒干。以身干、色棕黄、整齐者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，切段。

【性状】本品呈不规则段。花穗外被黄色细毛。断面内有 14~15 条花序。轴内外颜色相同。花梗为灰白色。气微，味淡。

【鉴别】取本品粉末 5g，加 70%乙醇 30ml，加热回流 30 分钟，放冷，滤过，滤液浓缩至约 2ml，加水 5ml 使溶解，用乙醚振摇提取 2 次，每次 15ml，合并乙醚液，蒸干，残渣加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取没食子酸对照品，加无水乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取供试品溶液 10 $\mu$ l、对照品溶液 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-丙酮-甲酸（7:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置氨蒸气中熏至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 14.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用 20%乙醇作溶剂，不得少于 33.0%。

【性味与归经】苦、涩，平。归大肠、肝经。

【功能与主治】燥湿，止血，散结。用于泄泻，痢疾，带下，便血，瘰疬，癭瘤。

【用法与用量】9~15g。

【贮藏】置通风干燥处。