

铁线透骨草

Tiexiantougucao

【药材来源】本品为毛茛科植物黄花铁线莲 *Clematis intricata* Bge. 的干燥地上部分。夏季花盛开时采割，除去隔年老茎及杂质，捆成小把，晒干。以叶多、色绿者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，洗净，闷润 2~4 小时，切段，干燥，筛去碎屑。

【性状】本品为不规则段。茎细，直径 1~3mm。表面灰绿色或灰黄色，有明显的纵棱，节稍膨大，叶对生，多破碎，完整的小叶披针形或狭卵形，中间小叶较长大，花萼钟形，淡黄色，瘦果扁卵形，上有宿存花柱羽毛状。气微，味淡。

【鉴别】取本品粉末 2g，加乙醇 20ml，振摇 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取铁线透骨草对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验。吸取上述两种溶液各 5~10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-丙酮-甲醇（7:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点；再喷以 10%磷钼酸乙醇溶液，在 105℃加热约 5 分钟。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【性味与归经】辛、苦，温。归肾、膀胱经。

【功能与主治】散风祛湿，解毒止痛。用于筋骨拘挛，风湿关节痛；外用治疮疡，风湿肿毒。

【用法与用量】 9~15g。外用适量，煎水熏洗患处。

【贮藏】置干燥处。