

## 松香

Songxiang

**【药材来源】** 本品为松科植物马尾松 *Pinus massonina* Lamb. 及其同属植物树干中取得的油树脂，经蒸馏除去挥发油后遗留的干燥树脂。夏季采收，在松树干上用刀挖成 V 字形或螺旋纹槽，使边材部的油树脂自伤口流出，收集后，加水蒸馏，使松节油流出，剩下的残渣冷却凝固后即为松香。以块整齐、半透明、油性大、香气浓者为佳。

**【炮制】** 取原药材，除去杂质。

**【性状】** 本品呈不规则半透明块状，大小不一。表面淡黄色至淡棕黄色，常附有黄白色粉霜。破碎面光亮，似玻璃状。质较松脆，易碎。具松节油香气，味苦。遇热软化。燃烧时产生棕色浓烟。

**【鉴别】** 取本品粉末 0.1g，加乙醇 25ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取松香酸对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取供试品溶液 1~2 $\mu$ l、对照品溶液 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 GF<sub>254</sub> 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-乙酸乙酯-冰乙酸（9: 1: 0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

**【检查】总灰分** 不得过 0.2%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

**【性味与归经】** 苦、甘，温。归肝、脾经。

**【功能与主治】** 燥湿祛风，生肌止痛。用于风湿痹痛；外治痈疽，疥癣，湿疮，金疮出血。

**【用法与用量】** 3~5g，煎汤，或入丸散用。外用适量，入膏药或研末贴敷患处。

**【贮藏】** 置阴凉干燥处，防火。