

炒草果仁

Chaocaoguoren

【药材来源】本品为姜科植物草果 *Amomum tsao-ko* Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干或低温干燥。以个大、饱满、色红棕、气味浓者为佳。

【炮制】取草果仁，置热锅内，用文火炒至表面鼓起，并有香气逸出时，取出，晾凉。

【性状】本品为圆锥状多面体，直径约5mm。表面棕褐色，有的可见外被残留淡黄色至灰白色膜质的假种皮，尖端有凹状的种脐。质硬，胚乳灰白色至黄白色。具特异香气，味辛、微苦。

【鉴别】取〔含量测定〕项下的挥发油，加乙醇制成每 1ml 含 50 μ l 的溶液，作为供试品溶液。另取桉油精对照品，加乙醇制成每 1ml 含 20 μ l 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 1 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（17:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 6.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【含量测定】照挥发油测定法（中国药典 2020 年版通则 2204 甲法）测定。本品含挥发油不得少于 1.4%(ml/g)。

【性味与归经】辛，温。归脾、胃经。

【功能与主治】燥湿温中，除痰截疟。用于寒湿内阻，脘腹胀痛，痞满呕吐，疟疾寒热，瘟疫发热。

【用法与用量】3~6g，用时捣碎。

【贮藏】置阴凉干燥处。