

白花蛇舌草

Baihuasheshecao

【药材来源】本品为茜草科植物白花蛇舌草 *Hedyotis diffusa* Willd. 的干燥全草。夏季采收，除去杂质及泥土，晒干。以叶多、色绿者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，洗净，稍晾，切段，干燥，筛去碎屑。

【性状】本品为不规则的段。茎纤细，扁圆柱形，绿色或黄褐色至褐色，有分枝。叶线形，全缘。蒴果单生或双生于叶腋，扁球形，直径 2~3mm，具短柄，种子细小。气微，味微苦。

【鉴别】取本品粉末 1g，加乙醇 20ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇（40:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 11.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用 60%乙醇作溶剂，不得少于 10.0%。

【性味与归经】苦、甘，凉。归心、肝、脾经。

【功能与主治】 消积败毒，消肿止痛。用于肠痈，小儿疳积，毒蛇咬伤，
癌肿；外治白疱疮，癰疮。

【用法与用量】 6～30g。

【贮藏】 置干燥处。