

炒乳香

Chaoruxiang

【药材来源】本品为橄榄科植物乳香树 *Boswellia carterii* Birdw. 及同属植物 *Boswellia bhaw-dajiana* Birdw. 树皮渗出的树脂。春、秋二季采收，割裂树干，收集流出的树脂，阴干。以颗粒状、色淡黄、半透明、气芳香者为佳。

【炮制】取原药材，除去树皮等杂质，大块者破碎，置热锅内，用文火炒至表面显油亮光泽，取出，晾凉。

【性状】本品呈长卵形滴乳状、类圆形颗粒或黏合成大小不等的不规则块状，表面油亮，黄色至棕黄色，略透明，质坚脆。有特异香气，味微苦。

【鉴别】（1）本品燃烧时显油性，冒黑烟，有香气；加水研磨成白色或黄白色乳状液。

（2）取本品粉末 0.2g，加甲醇 20ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取乳香对照药材 0.2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 1~2 μ l，分别点于同一 GF₂₅₄ 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-冰醋酸（10:4:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下观察。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】杂质 不得过 8.0%（中国药典 2020 年版通则 2301）。

总灰分 不得过 6.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【含量测定】取本品适量，精密称定，照挥发油测定法（中国药典 2020 年版通则 2204 甲法）测定。

本品含挥发油不得少于 1.0%（ml/g）。

【性味与归经】辛、苦，温。归心、肝、脾经。

【功能与主治】活血定痛，消肿生肌。用于脘腹疼痛，痛经，经闭，跌扑损伤，痈疽疼痛。偏于活血止痛。

【用法与用量】3~9g，多入丸散；外用适量，研末调敷患处。

【注意】孕妇禁用；胃弱者慎用。

【贮藏】置阴凉干燥处。