

宽筋藤

Kuanjinteng

【药材来源】本品为防己科植物中华青牛胆 *Tinospora sinensis* (Lour.) Merr. 的干燥藤茎。全年均可采收，除去老茎及叶，切段或趁鲜切厚片，晒干。以条匀、质嫩、色黄绿者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，洗净，浸泡 4~8 小时，取出，闷润 12~24 小时，至内外湿度一致，切厚片，干燥，筛去碎屑。若为产地片，除去杂质。

【性状】本品为不规则椭圆形或长椭圆形厚片。外表面黄绿色、黄褐色或棕黄色，具不规则纵皱纹及白色突起皮孔，栓皮易剥离。切面灰白色或黄白色，具车轮纹，有众多小孔。气微，味微苦。

【鉴别】（1）本品粉末浅灰色。木栓细胞表面观多角形，淡黄棕色。网纹导管及具缘纹孔导管多见，螺旋导管少见。石细胞类圆形或多角形，直径 20~40 μ m；内含草酸钙方晶。木纤维壁具人字形纹孔。韧皮纤维成束，木化，周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶鞘纤维。淀粉粒单粒类圆形或椭圆形，直径 3~20 μ m；复粒少数，由 2~3 分粒组成。

（2）取本品粉末 1g，加乙醇 20ml，加热回流 2 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取宽筋藤对照药材，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5:1:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%磷钼酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 11.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 9.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 10.0%。

【性味与归经】微苦，凉。归肝、肾经。

【功能与主治】 祛风止痛，舒筋活络。用于风湿痹痛，腰肌劳损，跌扑损伤。

【用法与用量】 9~15g。外用适量，捣敷患处。

【注意】 孕妇及产后忌服。

【贮藏】 置通风干燥处。