

## 金花茶

Jinhuacha

【药材来源】本品为山茶科植物金花茶 *Camellia nitidissima* Chi 或显脉金花茶 *Camellia euphlebia* Merr. ex Sealy 的干燥叶。全年均可采收，晒干。

【炮制】除去杂质，洗净，切丝，晒干。

【性状】本品呈丝条状，边缘有锯齿，齿端有一棕褐色或黑褐色小腺点。表面无毛，上表面灰绿色或黄绿色，下表面色较淡。下表面散生黄棕色或黄褐色小腺点，在扩大镜下可见密布灰白色的腺鳞。侧脉和网脉在叶下表面凸起。革质，稍皱缩卷曲。无臭，味微苦。

【鉴别】取本品粉末 0.2g，加甲醇 5ml，密塞，振摇 10 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取金花茶对照药材 0.2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-水（8:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 12.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的冷浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【性味与归经】微苦、涩，平。归肺、肝、膀胱经。

【功能与主治】清热解毒，利尿消肿。用于痈肿疮毒，咽喉肿痛，水肿淋浊，黄疸，小便不利。

【用法与用量】9~15g，或开水泡服。

【贮藏】置通风干燥处。