

干蟾

Ganchan

【药材来源】本品为蟾蜍科动物中华大蟾蜍 *Bufo bufo gargarizans* Cantor 或黑眶蟾蜍 *Bufo melanostictus* Schneider 的干燥体。夏、秋二季捕捉，杀死，除去内脏，洗净，晒干。以个大、身干、完整者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质及爪，加工成块。

【性状】本品呈不规则块或片状。背部黑褐色或绿棕色，有大小不等鼓起的圆形疣状突起。腹部黄白色，有明显黑色斑纹。气微腥，味咸。

【鉴别】取本品粉末 0.2g，加甲醇 20ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取干蟾皮对照药材 0.2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2~5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-三氯甲烷-丙酮（4:3:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰，分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【检查】水分 不得过 14.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

酸不溶性灰分 不得过 9.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 6.0%。

【性味与归经】辛，凉；有毒。归肝、脾、肺经。

【功能与主治】破结，行水，解毒，杀虫，定痛。用于疮发背，阴疽瘰癧，水肿，恶疮，小儿疳积。

【用法与用量】1~3g。外用适量。

【注意】孕妇慎用。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。