

蚕蛾

Can'e

【药材来源】本品为蚕蛾科昆虫家蚕 *Bombyx mori* Linnaeus 雄性成虫的干燥体。夏季选取腹部狭窄的成虫，置沸水中烫死，晒干。以虫体完整者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质。

【性状】本品略呈椭圆形或纺锤形，长 1.5~2.5cm，宽 0.5~1.2 cm，表面黄白色至棕褐色，可见残存的白色鳞片。头部较小，复眼 1 对，黑色，呈半圆形。口器退化，下唇须细小。触角 1 对，羽毛状，黑色。前胸节和中胸节吻合，翅 2 对，前翅位于中胸部，呈三角形，较大；后翅生于后胸，较小。足三对。腹部狭窄，末端稍尖。质脆易碎，断面多中空。气微腥，味微咸。

【鉴别】取本品粉末 0.5g，加乙醇 20ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 2ml 使溶解，离心（3000 转/分钟）5 分钟，取上清液作为供试品溶液。另取雄蚕蛾（家蚕）对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-醋酸-水（3:3:1）为展开剂，置 4℃以下展开，取出，晾干，喷以 0.5%茚三酮乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过13.0%（中国药典2020年版通则0832第二法）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 20.0%。

【性味与归经】咸，温。归肝、肾经。

【功能与主治】补肝益肾，壮阳涩精。用于阳痿，遗精，白浊，尿血，创伤，溃疡及烫伤。

【用法与用量】1~6g，用时去足、翅，多入丸散用。外用适量，研末撒或调敷患处。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。