

炒五谷虫

Chaowuguchong

【药材来源】本品为丽蝇科昆虫大头金蝇 *Chrysomya megacephala* (Fab.) 或其他近缘昆虫的干燥幼虫。夏、秋季捕捞，装入布袋，在流水中反复漂洗，使虫体内污物排尽，沸水烫死，低温干燥。

【炮制】取原药材，除去杂质，抢水洗净，用文火炒至微黄色。

【性状】本品呈圆柱形或扁圆柱形，长 1~2cm，直径 0.2~0.4cm。表面黄白色至黄色。头部稍尖，有深色的小点，尾部切断状，断面有空腔，质脆。气微臭，味淡。

【鉴别】取本品粉末 1g，加稀乙醇 10ml，超声处理 20 分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取亮氨酸对照品、缬氨酸对照品，加稀乙醇制成每 1ml 各含 2mg 的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 3 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（3:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 8.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 18.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的冷浸法测定，不得少于 11.0%。

【性味与归经】咸，寒。归脾、胃经。

【功能与主治】清热，消滞。用于痞积，腹胀，疳疮。

【用法与用量】3~9g。外用适量，研末搽敷。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。