

## 酒威灵仙

Jiuweilingxian

【药材来源】 本品为毛茛科植物威灵仙 *Clematis chinensis* Osbeck、棉团铁线莲 *Clematis hexapetala* Pall. 或东北铁线莲 *Clematis manshurica* Rupr. 的干燥根和根茎。秋季采挖，除去泥沙，晒干。以条匀、长、皮黑肉白或黄白，质坚实者为佳。

【炮制】取净威灵仙段，置容器内，用黄酒拌匀，闷润，置热锅内，用文火炒至微干，取出，晾凉。

每 100kg 净威灵仙段，用黄酒 15kg。

【性状】 本品呈不规则的段。表面黑褐色、棕褐色或棕黑色，有细纵纹，有的皮部脱落，露出黄白色木部。切面皮部较广，木部淡黄色，略呈方形或近圆形，皮部与木部间常有裂隙。微有酒气，味淡、咸或辛辣。

【鉴别】 取本品粉末 1g，加乙醇 50ml，加热回流 2 小时，滤过，滤液浓缩至 20ml，加盐酸 3ml，加热回流 1 小时，加水 10ml，放冷，用石油醚（60~90℃）25ml 振摇提取，分取石油醚液，蒸干，残渣加无水乙醇 10ml 使溶解，作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品，加无水乙醇制成每 1ml 含 0.45mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 3 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（20:3:0.2）为展开剂，薄层板置展开缸中预饱和 30 分钟，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 15.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 4.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【性味与归经】 辛、咸，温。归膀胱经。

**【功能与主治】**祛风除湿，通络止痛。用于风湿痹痛，腰膝疼痛、脚气、疟疾。

**【用法与用量】** 6~9g。

**【贮藏】** 密闭，置阴凉干燥处。