

焦白术

Jiaobaizhu

【药材来源】本品为菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 的干燥根茎。冬季下部叶枯黄、上部叶变脆时采挖，除去泥沙，烘干或晒干，再除去须根。以个大、表面色灰黄、断面色黄白、质坚实、香气浓郁者为佳。

【炮制】取净白术片，置热锅内，用中火炒至表面焦褐色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾干；必要时筛去碎屑。

【性状】本品为不规则厚片。表面焦褐色，断面焦黄色。质脆。有焦香气，味微苦。

【鉴别】取本品粉末 0.5g，加正己烷 2ml，超声处理 15 分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取白术对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述新制备的两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙酸乙酯（50:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点，并应显有一桃红色主斑点（苍术酮）。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用 60% 乙醇作溶剂，不得少于 40.0%。

【性味与归经】苦、甘，温。归脾、胃经。

【功能与主治】健脾止泻。用于脾虚泄泻，久痢，带下白浊。

【用法与用量】6~12g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。