

豆蔻皮

Doukoupí

【药材来源】 本品为姜科植物白豆蔻 *Amomum kravanh* Pierre ex Gagnep.或爪哇白豆蔻 *Amomum compactum* Soland ex Maton 的干燥成熟果实。按产地不同分为“原豆蔻”和“印尼白蔻”。以个大、饱满、完整、气味浓者为佳。

【炮制】取净豆蔻，剥取果皮，筛去碎屑。

【性状】本品呈不规则的片状。表面黄白色至淡黄棕色，具纵棱线。体轻，质脆。气微香，味微辛。

【鉴别】取本品粗粉 25g，置圆底烧瓶中，加水 300ml，连接挥发油测定器，自测定器上端加水使充满刻度部分，再加正己烷 2ml，连接回流冷凝管，加热至微沸，并保持 2 小时，放冷，分取正己烷层，作为供试品溶液。另取桉油精对照品，加正己烷制成每 1ml 含 25mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-二氯甲烷-乙酸乙酯（15:5:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%香草醛硫酸溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 10.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 15.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 6.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 5.0%。

【性味与归经】同豆蔻仁。

【功能与主治】散满消胀。用于胸闷不饥，食积不消。

【用法与用量】3~6g，入煎剂宜后下。

【贮藏】置干燥处。