

## 枸骨叶丝

Gouguyesi

【药材来源】 本品为冬青科植物枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. ex Paxt. 的干燥叶。秋季采收，除去杂质，晒干。以叶大、色绿者为佳。

【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切宽丝，干燥，筛去碎屑。

【性状】 本品为不规则宽丝，多卷曲。上表面黄绿色或绿褐色，有光泽，下表面灰黄色或灰绿色，有的边缘具刺齿。革质，硬而厚。气微，味微苦。

【鉴别】 取本品粉末 2g，加 70%乙醇 40ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水 40ml 使溶解，用三氯甲烷 40ml 振摇提取，弃去三氯甲烷液，水层加浓氨试液 2ml，摇匀，用水饱和的正丁醇 40ml 振摇提取，分取正丁醇液，浓缩至干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取枸骨叶对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 1  $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水（1：3：1：0.3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 8.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【性味与归经】 苦，凉。归肝、肾经。

【功能与主治】 清热养阴，益肾，平肝。用于肺痛咯血，骨蒸潮热，头晕目眩。

【用法与用量】 9～15g。

【贮藏】 置干燥处。