

黄药子

Huangyaozi

【药材来源】本品为薯蓣科植物黄独 *Dioscorea bulbifera* L. 的干燥块茎。夏末至冬初采挖，洗净泥土，除去须根，趁鲜切成厚片，干燥。以片大、外皮色灰黑、断面色黄白者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质。

【性状】本品为圆形或椭圆形厚片。外表皮棕褐色至黑褐色，具不规则皱纹，有多数圆点状须根痕或残留的须根。切面淡黄色至棕黄色，呈颗粒状，密布橙黄色麻点。质坚脆，粉性。气微，味苦。

【鉴别】（1）本品粉末黄棕色。石细胞长梭形，两端钝圆，或不规则椭圆形、卵状三角形，孔沟密集。淀粉粒单粒圆形、卵形、贝壳形或不规则形，直径 5~12 μm ，脐点点状。草酸钙针晶束存在于黏液细胞中，长 50~117 μm 。

（2）取本品粉末 5g，加二氯甲烷 30ml，加热回流 2 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加二氯甲烷 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取黄药子对照药材 5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 4 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-浓氨试液（9:1:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 磷钼酸乙醇溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 14.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 13.0%。

【性味与归经】苦，平；有小毒。归心、肝经。

【功能与主治】消痰软坚，散结消癭，清热解毒。用于癭瘤痰核，癥瘕痞块，疮痈肿毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤。

【用法与用量】5~9g。外用适量，研末调敷患处。

【贮藏】置通风干燥处，防霉，防蛀。