

炒桂枝

Chaoguizhi

本品为桂枝的炮制品。

【炮制】取净桂枝段或片，置热锅内，用中火炒至颜色变深，取出，晾凉。

【性状】本品为类圆形、椭圆形片或不规则形段，直径 0.3~1cm。外表皮红棕色至深棕色，有的有焦斑，有时可见点状皮孔或纵棱线。切面皮部红棕色至深棕色，木部浅黄棕色，髓部类圆形或略呈方形。有特异香气，味甜、微辛。

【鉴别】（1）本品粉末红棕色。石细胞类方形或类圆形，直径 30~64 μ m，壁厚，有的一面菲薄。韧皮纤维大多成束或单个散离，无色或棕色，梭状，有的边缘齿状突出，直径 12~40 μ m，壁甚厚，木化，孔沟不明显。油细胞类圆形或椭圆形，直径 41~104 μ m。木纤维众多，常成束，具斜纹孔或相交成十字形。木栓细胞黄棕色，表面观多角形，含红棕色物。导管主为具缘纹孔，直径约至 76 μ m。

（2）取本品粉末 0.5g，照桂枝段项下的〔鉴别〕（2）试验，显相同的结果。

【检查】水分 不得过 8.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 4.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 4.0%。

【含量测定】取本品粉末（过四号筛）约 0.5g，精密称定，照桂枝段项下的〔含量测定〕方法测定。

本品按干燥品计算，含桂皮醛（C₉H₈O）不得少于 0.90%。

【性味与归经】【功能与主治】【用法与用量】【注意】【贮藏】同桂枝段。