

## 大风子

Dafengzi

**【药材来源】**本品为大风子科植物大风子 *Hydnocarpus anthelmintica* Pierre 的干燥成熟种子。果实成熟时采收，除去果皮，取出种子，洗净，干燥。以个大、种仁饱满、色白、油性足者为佳。

**【炮制】**取原药材，除去杂质。

**【性状】**本品呈不规则的卵圆形或多面形，稍有钝棱。长 1~2.5cm，直径 1~2cm。表面灰棕色或灰褐色，有细纹，较小的一端有明显的沟纹。种皮厚而坚硬，内表面光滑，浅黄色或黄棕色。种仁与种皮分离，外被一层红棕色或暗紫色薄膜。种仁 2 片，乳白色至淡黄色，富油性。气微，味淡。

**【鉴别】**取本品粉末 1g，加 2mol/L 盐酸乙醇溶液 30ml，加热回流 1.5 小时，滤过，滤液加水 20ml，置水浴上蒸至无醇味，移至分液漏斗中，用乙酸乙酯 40ml 振摇提取，分取乙酸乙酯液，蒸干，残渣加无水乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取大风子对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 1 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯（10:0.3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1%香草醛硫酸溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

**【检查】水分** 不得过 8.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

**黄肉、黑心和虫蛀及空壳率** 取本品 250g，打开外壳（种皮），掰开种仁，拣取黄肉及其外壳称重；黑心和虫蛀及其外壳与空壳称重，黄肉率不得过 25%；黑心和虫蛀及空壳率不得过 6%。

**【性味与归经】** 辛，热；有毒。归肝、脾、肾经。

**【功能与主治】** 祛风燥湿，攻毒杀虫。用于麻风，疥癣。

**【用法与用量】** 1.5~3g，用时捣碎。外用适量。

**【注意】** 内服慎用，阴虚血热者忌服。

**【贮藏】** 置通风干燥处，防蛀。

## 北京市中药饮片炮制规范（2023 年版）

---

注：黄肉（即黄色种仁）：系指泛油变黄棕色的种仁。黑心和虫蛀：系指种仁发黑或虫蛀者。空壳：系指不含种仁者。