

## 藜芦

Lilu

【药材来源】本品为百合科植物藜芦 *Veratrum nigrum* L.的干燥根及根茎。初夏花未开时采挖，除去杂质，洗净，晒干。以根茎粗、质坚实者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，喷淋清水，闷润 2~4 小时，至内外湿度一致，切段，干燥，筛去碎屑。

【性状】本品为段状。外表面黑褐色，有时根茎顶端可见残留有叶基、棕毛状纤维及簇生多数须状根。须状根直径 2~4mm，表面灰黄色或灰褐色，有横皱纹。体轻，质脆，易折断，断面白色或黄白色，粉性。气微，味苦。

【鉴别】取本品粉末 1g，加甲醇 20ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取白藜芦醇对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取供试品溶液 10 $\mu$ l、对照品溶液 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-乙酸乙酯-甲酸（4:3:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 10.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 5.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【性味与归经】辛、苦，寒；有毒。归肺、胃、肝经。

【功能与主治】散风定癰，催吐，祛痰，杀虫。用于中风痰迷，喉痹，疟疾，疥癣，恶疮。

【用法与用量】0.3~0.6g，研末吞服，或入成药。外用适量。

【注意】内服宜慎。孕妇忌用。不宜久服、多服。不宜与人参、西洋参、党参、苦参、丹参、玄参、北沙参、南沙参、白芍、赤芍、细辛同用。

【贮藏】置干燥处。