

桑黄

Sanghuang

【药材来源】本品为锈革孔菌科瓦宁木层孔菌 *Sanghuangporus vaninii* (Ljub) L. W. Zhou & Y. C. Dai 的干燥子实体。

【炮制】取原药材，除去杂质，润透，切厚片，干燥。

【性状】本品为不规则的厚片。外表面黄棕色、棕褐色或金黄褐色，切面棕黄色或棕褐色，菌肉硬，木质。气微，味淡。

【鉴别】（1）本品粉末黄色至黄棕色。菌丝黄色至棕黄色，分枝或少分枝，常单分隔或不分隔，壁薄厚不一。孢子偶见，卵圆形，黄棕色至棕褐色。

（2）取本品粉末 2g，加甲醇 60ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 3ml 使溶解，作为供试品溶液。另取桑黄对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）试验，吸取上述两种溶液各 5~10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（8:5:2）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 15.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 5.0%。

【性味与归经】辛、微苦，寒。归肝、胃、大肠经。

【功能与主治】软坚散结，活血化瘀，清胃，止泻。用于癥瘕积聚，瘰癧，痰核，崩漏带下，胃热呕吐，湿热泻痢，外伤出血。

【用法与用量】10~30g。外用研末适量。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。