

桂皮

Guipi

【药材来源】 本品为樟科植物天竺桂 *Cinnamomum japonicum* Sieb、阴香 *Cinnamomum burmannii* (C. G. et Th. Nees) Bl.、香桂 *Cinnamomum subavenium* Miq. 或华南桂 *Cinnamomum austrosinense* H. T. Chang 的干燥树皮。冬季剥取树皮，阴干。以皮薄、色红棕、香气浓者为佳。

【炮制】 取原药材，除去杂质，加工成碎块。

【性状】 本品为不规则的块片。外表面灰褐色，密生不明显的小疤（皮孔）或有灰白色斑。内表面红棕色或棕褐色，光滑，隐约可见细纵纹。质硬而脆，易折断，断面红棕色。气清香而凉，略似樟脑，味微甜、辛。

【鉴别】 取本品粉末 0.5g，加乙醇 10ml，密塞，浸泡 20 分钟，时时振摇，滤过，滤液作为供试品溶液。另取桂皮醛对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1 μ l 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取供试品溶液 10~15 μ l、对照品溶液 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-乙酸乙酯（17:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以二硝基苯肼乙醇试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的橙红色斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 5.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【性味与归经】 辛，温。归心、肝、脾、肾经。

【功能与主治】 暖脾胃，散风寒，通血脉。用于脘腹冷满，呕吐，风湿痹痛，跌扑瘀血，月经不调。

【用法与用量】 3~6g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。