

沉香曲

Chenxiangqu

【药材来源】本品为沉香、檀香等药与六神曲经混合加工制成。以色淡、气香浓者为佳。

【炮制】取沉香、檀香、姜厚朴、六神曲粉碎成细粉，另取面粉打成糊，与药粉混合成坨，加工成长方块状或圆柱状，干燥。

配方：沉香 10g 檀香 5g 姜厚朴 5g 六神曲 40g 面粉 16g

【性状】本品呈长方块状或圆柱状，长约 1~2cm，宽约 1cm，厚约 1cm。表面灰色至灰黄色，粗糙有裂隙。质硬脆。气香，味微苦。

【鉴别】（1）本品粉末棕黄色。纤维管胞长梭形，多成束，纹孔相交成十字形、人字形；韧型纤维单个散在，有单斜纹孔；导管为具缘纹孔；树脂团块黄棕色（沉香、檀香）。

（2）取本品 30g，置圆底烧瓶中，加水 200ml，连接挥发油测定器，自测定器上端加水至刻度，再加乙醚 1ml，连接回流冷凝管，加热至微沸，并保持 3 小时，放冷，分取乙醚液，作为供试品溶液。另取檀香醇对照品，加乙醚制成每 1ml 含 5 μ l 的溶液（或取檀香油对照品，加乙醚制成每 1ml 含 10 μ l 的溶液），作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-乙酸乙酯（17:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以对二甲氨基苯甲醛溶液（取对二甲氨基苯甲醛 0.25g，溶于冰醋酸 50g 中，加 85%磷酸 5g 与水 20ml，混匀），在 80~90℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的紫蓝色斑点。

（3）取本品粉末 0.5g，加甲醇 5ml，密塞，振摇 30 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液，另取厚朴酚对照品与和厚朴酚对照品，加甲醇制成每 1ml 各含 1mg 的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-甲醇

(27:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1%香草醛硫酸溶液，在 100℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 11.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 11.0%。

【性味与归经】苦，温。归肝、肺、胃经。

【功能与主治】舒肝和胃，健脾化滞。用于肝胃不和，脾虚湿滞所致的胸闷脘胀，胁肋作痛，吞酸呕吐等症。

【用法与用量】3～6g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。