

## 红药子

Hongyaozi

【药材来源】本品为蓼科植物毛脉蓼 *Polygonum cillinerve* (Nakai) Ohwi 的干燥根。春、秋二季采挖，除去茎叶及须根，洗净，切成块片，晒干。以片大、断面色棕黄、质坚实者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，筛去灰屑。

【性状】本品为不规则长椭圆形、矩圆形或圆形的块片。外表皮红褐色或棕黑色。切面棕黄色或红棕色，木质部浅黄色，呈环状，近髓部有分散的木质束。质坚硬。气微，味苦。

【鉴别】本品横切面：木栓层为 10 余列细胞，栓内层为 4~5 列细胞；皮层较薄。韧皮部宽广，韧皮射线宽。束间形成层不明显。木质部导管稀少，由木纤维围绕成束，略成二轮排列，并有纵走的导管。髓部有开始分化的异型维管束。皮层及韧皮部均有多数纤维束存在。薄壁细胞中有多数草酸钙簇晶，直径 20~60 $\mu\text{m}$ 。淀粉粒长圆形、近三角形，直径 4~12 $\mu\text{m}$ ，脐点裂缝状或十字状。

【检查】总灰分 不得过 5.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【性味与归经】苦、微涩，凉。归肺、大肠、肝经。

【功能与主治】清热解毒，凉血止血。用于胃肠炎，菌痢，扁桃体炎，月经不调；外用治外伤出血，烫伤，痈疖。

【用法与用量】1.5~3g。外用适量。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。