

苦丁香

Kudingxiang

【药材来源】本品为葫芦科植物甜瓜 *Cucumis melo* L. 的干燥果柄。夏、秋二季果实成熟时采收，取下果柄，晒干。以色黄褐、味苦者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质。

【性状】本品略呈圆柱状，多扭曲。表面黄绿色或黄褐色，具纵棱。一端渐膨大，边缘反卷。质轻而韧，断面纤维性。气微，味苦。

【鉴别】取本品粉末 1g，加乙醇 25ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取甜瓜蒂对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 3 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-甲酸（1:1:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%香草醛硫酸溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用 80%乙醇作溶剂，不得少于 18.0%。

【性味与归经】苦，寒；有小毒。归脾、胃经。

【功能与主治】催吐。用于食物中毒，痰涎壅塞，癫痫。

【用法与用量】0.6~1.5g。

【注意】体弱、心脏病患者忌服。

【贮藏】置通风干燥处。