

佛耳草（鼠曲草）

Fo'ercao

【药材来源】本品为菊科植物鼠曲草 *Gnaphalium affine* D. Don 的干燥全草。春、夏二季花开时采收，除去杂质，干燥。以色灰白、叶及花多者为佳。

【炮制】取原药材，除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥，筛去碎屑。

【性状】本品为不规则段。根较细，灰棕色。茎细圆柱形，灰白色，密被绵毛。叶片皱缩卷曲，两面密被灰白色绵毛。头状花序呈金黄色或棕黄色。质柔软。气微，味苦涩。

【鉴别】取本品粉末 1g，加 80% 甲醇 50ml，加热回流 1 小时，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加水 10ml 使溶解，用乙醚振摇提取 2 次，每次 10ml，弃去乙醚液，水液加稀盐酸 10ml，置水浴中加热 1 小时，取出，迅速冷却，用乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 20ml，合并乙酸乙酯液，用水 30ml 洗涤，弃去水洗液，乙酸乙酯液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取槲皮素对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取供试品溶液 5 μ l、对照品溶液 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（10:8:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 3% 三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 10.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 16.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 15.0%。

【性味与归经】 微甘，平。归肺经。

【功能与主治】 祛痰，止咳，平喘，祛风湿。用于咳嗽，痰喘，风湿痹痛。

【用法与用量】 9～30g。

【贮藏】 置通风干燥处。