

## 枳椇子

Zhijuzi

【药材来源】 本品为鼠李科植物枳椇 *Hovenia dulcis* Thunb. 的干燥成熟种子。10~11 月果实成熟时采收，晒干，除去果壳、果柄等杂质，收集种子。以粒大、饱满、色棕红、有光泽者为佳。

【炮制】 取原药材，除去杂质。

【性状】 本品呈扁圆形，直径 3~5.5mm，厚 1.5~2.5mm。表面棕红色、棕黑色或绿棕色，有光泽，平滑或可见散在的小凹点，顶端有微凸的合点，基部凹陷处有点状种脐，背面稍隆起，腹面有一条纵行隆起的种脊。种皮坚硬，不易破碎，胚乳乳白色，子叶淡黄色，肥厚，均富油性。气微，味微涩。

【鉴别】 本品粉末黄白色至灰棕色。种皮栅状细胞淡黄色，侧面观狭条形，长 170~360 $\mu$ m，宽约 20 $\mu$ m，两端壁薄，侧壁厚；顶面观呈圆多角形，排列紧密，胞腔细小。色素细胞黄色至深棕色，不规则多角形，大小不一。外胚乳颓废，细胞含草酸钙方晶，多角形或扁方形。子叶细胞含圆簇状小结晶，直径 3~8 $\mu$ m；油滴众多。

【检查】 水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 6.0%。

【性味与归经】 甘，平。归胃经。

【功能与主治】 通利二便，止渴除烦，解酒毒。用于二便不利，酒醉，烦热，口渴，呕吐。

【用法与用量】 4.5~9g，用时捣碎。

【贮藏】 置通风干燥处。