

## 鼠妇虫

Shufuchong

**【药材来源】** 本品为卷甲虫科动物普通卷甲虫 *Armadillidium vulgare* Latreille 或鼠妇科动物光滑鼠妇 *Porcellio leavis* Latreille 的干燥体。夏、秋二季捕捉，置沸水中烫死，干燥。

**【炮制】** 取原药材，除去杂质，洗净，干燥。

**【性状】普通卷甲虫** 全体长椭圆形而稍扁，长约 0.7~1.2cm，宽约 0.3~0.5cm，多卷曲成球形或半球形。背隆起，平滑，表面灰色至暗褐色，或有灰白色与灰黑色相间的斑纹，略具光泽，腹部内陷。头部小，近长方形，嵌入第一胸节前缘，前缘中央钝叶明显，后缘短宽；有复眼 1 对，触角 2 对，多脱落，第一触角细小，不易观察，第二触角较短，触柄 5 节，触鞭 2 节，末节长于近体节。背板由多数近平行的环节构成，呈覆瓦状排列。胸节 7，宽广，胸肢 7 对，各节具同形足 1 对。腹部与胸部背板近等宽，两者边缘联接呈一弧线；腹节 5，第一、二节窄，侧缘被第七胸节覆盖，第三至五腹节侧缘与尾节后缘连成半圆形，腹肢 5 对。尾节呈倒梯形，末端平直，尾肢扁平，外肢节背面观呈三角形，末端与尾节嵌合齐平，内肢节与尾节近等长。尾节后缘圆平，第五腹节、尾节及尾枝后缘围成半圆形。质脆易碎。气腥臭，味微咸。

**光滑鼠妇** 全体椭圆形，长约 1cm，宽约 0.3~0.6cm，扁平，不卷曲或稍卷曲但不成球状。灰色至棕褐色，背部具灰白色花纹，分布于背板两侧，中间形成一较明显无纹暗带。头部近长方形，前缘叶状突发达，中叶钝三角形，侧叶大而大；有复眼 1 对，发达，突出于头前端两侧；触角 2 对，多脱落，第一触角细小，不易观察，第二触角较短，触柄 5 节，触鞭 2 节，末节与近体节等长。胸节 7，各节近等长，胸肢 7 对，各节具同形足 1 对。腹节 5，第一、二节窄，侧缘被第七胸节覆盖，腹肢 5 对。尾节倒三角形，尾肢内肢节较尾节稍长，外肢呈长锥形，长于尾节。质脆易碎。气腥臭，味微咸。

**【鉴别】** 取本品粉末 1g，加无水乙醇 20ml，加热回流 30 分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取鼠妇虫对照药材 1g，

同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙醇(10:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10 %硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

**【检查】水分** 不得过 12.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

**酸不溶性灰分** 不得过 7.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

**【性味与归经】**酸，咸，凉。归肝、肾经。

**【功能与主治】**破血祛瘀，通经止痛，解毒利水。用于经闭，癥瘕，久疟，小便不利。

**【用法与用量】** 0.9～1.5g，研末服用；煎汤 3～9g。

**【注意】**孕妇慎用。

**【贮藏】**置干燥处，密闭，防蛀。