

蚕蛹

Canyong

【药材来源】本品为蚕蛾科昆虫家蚕 *Bombyx mori* Linnaeus 蛹的干燥体。由缂丝后的蚕茧中取出或剪切直接取出，晒干或低温烘干。

【炮制】取原药材，除去杂质。

【性状】本品略呈纺锤形或略扁纺锤形，长 1.4~3.5cm，宽 0.8~1.4cm。表面棕黄色至棕褐色，有油脂样或蜡样光泽。头部钝圆，尾部钝圆而略尖，腹面皱缩而凹陷。头部可见未完全分化的触角，一对眼及足；未完全分化的薄翅紧贴上腹部两侧；下腹部为环节。背面头部为未分化的倒三角形盾片，以下约有 10 个环节，其中颈部及尾部 3 节不甚明显。质脆易碎，断面淡黄色至棕黄色，中空。气微腥，味微咸。

【鉴别】取本品粉末 1g，加水 10ml，加热至沸，滤过，滤液作为供试品溶液。另取蚕蛹对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2~5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（4:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

酸败度 照酸败度检查法（中国药典 2020 年版通则 2303）测定。

酸值 不得过 25.0。

羰基值 不得过 28.0。

过氧化值 不得过 0.50。

总灰分 不得过 9.5%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【含量测定】取本品粉末（过二号筛）约 3g，精密称定，置索氏提取器中，加乙醚 100ml，加热回流提取至脂肪油提尽（约 6 小时），收集提取液，置已干燥至恒重的蒸发皿中，在水浴上低温蒸干，在 100℃干燥 1 小时，移至干燥器中，冷却 30 分钟，精密称定，计算，即得。

本品按干燥品计算，含脂肪油不得少于 27.0%。

【性味与归经】甘、辛、咸，微温。归脾、胃、肝、肾经。

【功能与主治】祛风湿，镇惊，化痰，生津止渴，消食理气。用于惊痫，中风抽搐，头痛，咽喉肿痛，丹毒，风痰癰疔，消渴，消瘦。

【用法与用量】3~15g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防霉、防蛀。