

金雀根

Jinquegen

【药材来源】本品为豆科植物锦鸡儿 *Caragana sinica* (Buc'hoz) Rehd. 的干燥根。夏、秋二季采挖，除去须根，洗净，干燥；或切厚片，干燥。

【炮制】取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去碎屑。若为产地片，除去杂质。

【性状】本品为类圆形厚片，直径 0.5~2.5cm。外皮黑褐色，易剥落，有的可见须根痕。切面淡黄色至淡黄棕色，纤维性，形成层环明显。质硬。气微，味微苦，嚼之有豆腥气。

【鉴别】（1）本品粉末淡黄色或黄色。纤维成束或散在，周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。木栓细胞呈碎块状，表面观类多角形。导管多见网纹导管和具缘纹孔导管。

（2）取本品粉末 1g，加甲醇 25ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取金雀根对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 3 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-甲酸（7:10:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%香草醛硫酸溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 10.0%。

【性味与归经】甘、辛、微苦，平。归肺、脾经。

【功能与主治】补肺健脾，活血祛风。用于虚劳倦怠，头晕，耳鸣眼花，肺虚久咳，月经不调、白带，风湿痹痛，跌打损伤。

【用法与用量】15~30g。

【贮藏】置干燥处。